

# NICARB<sup>®</sup>

## PRÉMÉLANGE

Ingrédient Actif: Chaque kg renferme 250g nicarbazin

Usage vétérinaire  
seulement

Contenu net 25 kg

No. D'enregistrement  
00140546

Huvepharma<sup>®</sup>, 33 James Boucher Blvd., Sofia 1407, Bulgaria



### Indications:

Poulets et  
poulettes  
remplacement

1. Pour aider à prévenir la mortalité attribuable à la coccidiose chez les poulets, durant les périodes d'exposition bénigne à cette affection.

TENEUR RECOMMANDÉE: de 0,01 % à 0,0125 % de nicarbazin.

2. Pour aider à prévenir la mortalité attribuable à la coccidiose chez les poulets.

TENEUR RECOMMANDÉE: de 0,0125 % à 0,015 % de nicarbazin.

3. Dans les moulées de début et de croissance, pour aider à prévenir la mortalité attribuable à la coccidiose jusqu'à l'âge de 12 semaines chez les poulets.

TENEUR RECOMMANDÉE: 0,020 % de nicarbazin.

4. Pour aider à prévenir la mortalité attribuable à la coccidiose durant la période où les poulettes de remplacement s'immunisent contre cette maladie (poulets de 8 semaines et plus).

TENEUR RECOMMANDÉE: 0,008 % de nicarbazin à partir de 8 semaines d'âge ou plus et jusqu'à ce que les oiseaux soient transférés au local de ponte.

Usage réservé à la fabrication de moulées.

### Mode de préparation:

Distribuer cet aliment médicamenté à l'exclusion d'autre aliment.

Il est recommandé de fabriquer un prémélange avant l'incorporation à la moulée complète. Mélanger 25 kg de NICARB à 225 kg d'un ingrédient de la moulée et utiliser ce prémélange à 2,5 % selon le tableau suivant:

Teneur recommandée de nicarbazin dans la moulée complète	Quantité requise du prémélange à 2,5% par tonne métrique
0,008%	3,2 kg
0,010%	4,0 kg
0,0125%	5,0 kg
0,020%	8,0 kg

### MISE EN GARDE

1. Ne pas servir à des sujets de reproduction ou à des poules pondeuses durant la période de ponte.

2. Les oiseaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins quatre (4) jours après le dernier traitement avec ce médicament.

### PRÉCAUTION

1. Ne pas utiliser de moulée médicamenteuse au nicarbazin pour traiter les épidémies de coccidiose.

2. En cas de mortalité imprévue, obtenir un diagnostic précis et suivre les recommandations du vétérinaire ou du pathologiste aviaire.

### NOTE

Chez les poulets de grill, la teneur moyenne recommandée est de 0,0125 % de nicarbazin.

### ENTREPOSAGE

Entreposer ce produit dans un endroit sec à la température de la pièce.  
Garder hors de la portée des enfants.



Distribuer par: Bio Agri Mix LP  
C.P 399, Mitchell, ON  
NOK 1N0  
www.bioagrimix.com