

CHLOR 250 PRÉMÉLANGE GRANULÉ

Usage vétérinaire
seulement
Contenu net 25 kg
No. D'enregistrement
00641979

Ingrédients Actifs: chlorhydrate de chlortétracycline 44g/kg;
Sulfaméthazine 44g/kg; Pénicilline (de pénicilline G procaine) 22g/kg



MODE D'EMPLOI

Moulées de pre-debut et debut pour les porcs :
Ajouter et mélanger parfaitement à la moulée en
quantité voulue pour fournir 2,5 kg de CHLOR 250
par tonne métrique (1 000 kg) de moulée finie
(complète). Chlorhydrate de chlortétracycline
0,011% (110 mg/kg); sulfaméthazine 0,011%
(110 mg/kg); pénicilline 0,0055% (55 mg/kg).

1. Pour aider à maintenir le taux de croissance et
l'efficacité alimentaire en présence de Rhinite
Atrophique - servir de façon continue comme seule
nourriture. Note: Le produit n'agit pas contre l'agent
pathogène de la Rhinite Atrophique.

2. Pour aider à maintenir les augmentations de
poids et stimuler l'appétit durant les périodes de
stress dû au déménagement, à la vaccination, aux
changements extrêmes de température et à la
castration - servir de façon continue durant les
périodes de stress et jusqu'à 10 jours après
élimination de l'état de stress.

Autres moulées porcines :

Note : Ce mélange de drogue ne peut pas être
employé pour aliments de croissance ou aliments
de finition pour les porcs de marchés sauf avec une
ordonnance d'un vétérinaire.

Ajouter et mélanger parfaitement à la moulée en
quantité voulue pour fournir 2,5 kg de CHLOR 250
par tonne métrique (1 000 kg) de moulée finie
(complète).

1. Pour aider à maintenir le taux de croissance et
l'efficacité alimentaire en présence de Rhinite
Atrophique - servir de façon continue comme
seule nourriture. Note: Le produit n'agit pas
contre l'agent pathogène de la Rhinite Atrophique.

2. Pour aider à maintenir les augmentations de
poids et stimuler l'appétit durant les périodes de
stress dû au déménagement, à la vaccination,
aux changements extrêmes de température et à
la castration - servir comme seule nourriture
durant les périodes de stress et jusqu'à 10 jours
après élimination de l'état de stress.

3. Pour aider à prévenir l'entérite bactérienne (y
compris salmonellose causé par la *Salmonella*
choleraesuis et la dysenterie Vibrio) - servir
comme seule nourriture durant la première partie
de la période de croissance (25 à 30 kg).

4. Pour aider à traiter l'entérite bactérienne (y
compris salmonellose causé par la *Salmonella*
choleraesuis. et la dysenterie Vibrio) - servir de
façon continue comme seule nourriture jusqu'à
trois jours après disparition des symptômes.

Note : Dans les cas de traitement spécifique à une
ou plusieurs allégations l'étiquette doit mentionner
les porcs ayant perdu l'appétit doivent être traités
individuellement.

MISE EN GARDE:

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à
des fins alimentaires dans un délai d'au moins 10
jours après le dernier traitement avec cette drogue

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit sec et frais en dessous
de 30°C. Éviter le gel.