

CHLOR S 700 PRÉMÉLANGE GRANULÉ

Usage vétérinaire
seulement
Contenu net 25 kg
No. D'enregistrement
00655708

Ingrédients Actives: chlortétracycline 77g/kg; sulfaméthazine 77g/kg



INDICATIONS:

Pour aider au maintien des gains de poids et de l'efficacité alimentaire des bovins pendant les périodes stress, dû au sevrage, au transport à la manutention.

MODE D'EMPLOI:

À utiliser dans les moulées pour bovins de boucherie.

Mélanger suffisamment CHLOR S 700 dans la nourriture pour obtenir 350 mg d'chlortétracycline et 350 sulfaméthazine par tête et par jour.

Le tableau suivant montre les quantités de CHLOR S 700 nécessaires pour les différentes quantités consommées.

Supplément consommé par animal par jour	Pour faire une tonne métrique (1 000 kg) de nourriture, ajouter CHLOR S 700 tel qu'indiqué ci-dessous	Une tonne métrique (1 000 kg) du supplément contiendra	
		Chlortétracycline	Sulfaméthazine
kg	kg	g	g
0,25	18,0	1400	1400
0,5	9,0	700	700
1,0	4,5	350	350
2,0	2,3	175	175
4,0	1,1	87	87
5,0	0,9	70	70
10,0	0,45	35	35

ATTENTION:

A n'utiliser que pendant les 4 premières semaines après la mise des bovins à l'enclos. Il n'est pas recommandé de commencer à donner de CHLOR S 700 lorsque les bovins sont nourris au grain.

MISE EN GARDE:

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 10 jours après le dernier traitement avec cette drouge

ENTREPOSAGE:

Conserver dans un endroit sec et frais en dessous de 30°C
Éviter le gel.



Fabriqué par: Bio Agri Mix LP
C.P 399, Mitchell, ON
N0K 1N0
www.bioagrimix.com