

COYDEN[®] 25

PRÉMÉLANGE MÉDICAMENTEUX ANTICOCCIDIEN

Ingrédient Actif: clopidol 250g/kg

Usage vétérinaire
seulement

Contenu net 25 kg

No. D'enregistrement
00656925

Huvepharma[®], 33 James Boucher Blvd., Sofia 1407, Bulgaria



Indications:

Le prémélange coccidiostatique Coyden[®] 25 doit être administré d'une façon continue avec les moulées pour prévenir les coccidioses caecales et intestinales chez les poulets de gril et les poulettes jusqu'à l'âge de 16 semaines.

Pour emploi dans les moulées médicamenteuses pour les poulets de gril et les poulettes

Poulets et
poulettes

Mode d'emploi :

On suggère un prémélange de COYDEN[®] 25 avec un autre ingrédient alimentaire avant le mélange final. Ceci assurera une distribution plus uniforme dans la moulée médicamenteuse. Utiliser 500 grammes de COYDEN[®] 25 par tonne métrique de moulée pour obtenir une moulée médicamenteuse contenant 0,0125% de clopidol. COYDEN[®] 25 doit être réparti également dans la moulée.

POUR POULETS DE GRIL

La moulée médicamenteuse au clopidol doit être utilisée comme seule ration de façon continue depuis l'âge d'un jour jusqu'à l'abattage.

POUR LES POULETTES DE REMPLACEMENT

La moulée médicamenteuse au clopidol doit être utilisée comme seule ration de façon continue jusqu'à l'âge de 16 semaines.

MISE EN GARDE

1. Ne pas distribuer aux pondeuses
2. Ne pas nourrir au clopidol les poulettes après l'âge de 16 semaines.

ENTREPOSAGE

Entreposer ce produit dans un endroit sec à la température de la pièce. Maintenir hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTION

1. Ne pas nourrir au clopidol les volailles destinées à la reproduction.
2. Ne pas se servir de cet aliment médicamenteux pour réprimer des épidémies de coccidiose.
3. Consulter un vétérinaire ou un pathologiste aviaire si les pertes excèdent 0,5% en deux jours

AVIS

Ne pas expédier ni entreposer avec des articles toxiques ou dégageant une forte odeur.

Ne pas contaminer