

# Penicillin G Potassium USP

Poudre hydro-soluble pour **dindes et porcs**

INGRÉDIENT ACTIF : Chaque pot contient : Pénicilline G Potassium 500 000 000 U.I.

DIN 02139219



## Indications :

Dindes

Comme adjuvant à la prévention/traitement d'infections chez les dindes causées par des organismes sensibles à la pénicilline tels que *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

Porcs

Pour le traitement d'infections causées par *Streptococcus suis* sensible à la pénicilline.

## Posologie et administration :

Porcs et dindes

Dissoudre le contenu d'un (1) pot dans 1682 L (370 gal. imp.) d'eau de boisson (ou 0,2 g de poudre par 1 L d'eau).

Cette quantité fournira approximativement 297, 000 U.I. de pénicilline par 1 L d'eau de boisson.

Administrer comme seule source d'eau de boisson pendant :

3 à 5 jours chez les dindes

5 jours chez les porcs

Préparer des solutions fraîches chaque jour.

## ENTREPOSAGE

Protéger contre la chaleur excessive et l'humidité.

## MISE EN GARDE

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 1 jour après le dernier traitement avec ce médicament. Ne pas utiliser chez les oiseaux produisant des oeufs pour des fins alimentaires.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**