

# SALINOMYCIN 60

PRÉMÉLANGE MÉDICAMENTEUX ANTICOCIDIEN

Usage vétérinaire  
seulement

Contenu net 25 kg

No. D'enregistrement  
02237431

Ingrédient Actif: salinomycine sodique 60g//kg



Poulets de  
gril

## Indications:

Le Prémélange Salinomycin 60 est indiqué pour aider à prévenir la coccidiose causée par *Eimeria acervulina*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. maxima*, *E. tenella* et *E. brunetti* chez le poulet de gril.

Usage réservé à la fabrication de moulées

## Mode d'emploi :

Mélanger soigneusement 1000 grammes (1,0 kg) de Prémélange Salinomycin 60 a 999,0 kg de moulée pour obtenir une moulée complète contenant 60 mg/kg (60 ppm) de salinomycine sodique. La moulée médicamenteuse doit être servie continuellement et exclusivement jusqu'à l'abattage.

## MISE EN GARDE

1. Ne pas administrer aux poulets de remplacement, aux pondeuses et aux reproducteurs.
2. Le personnel manipulant le produit concentré devrait porter un masque, des gants et des vêtements protecteurs.
3. Garder ce produit, ainsi que tout médicament, hors de la portée des enfants.

## PRÉCAUTION

1. Ne pas laisser les dindons, les chiens ou les chevaux accéder à cette moulée médicamenteuse, celle-ci est toxique pour ces espèces. Une attention particulière devra être portée pour éviter la contamination de la nourriture destinée à ces animaux.
2. Une réduction du poids peut survenir chez les jeunes coqs s'ils ne sont pas exposés aux coccidies.
3. Ne pas administrer de tiamuline aux oiseaux nourris avec cette moulée médicamenteuse.
4. Ne pas utiliser dans le moulées qui contiennent des agents liants pour granules.
5. Ne pas utiliser cette moulée pour traiter les épidémies de coccidiose.
6. Consulter un vétérinaire ou un pathologiste aviaire si les pertes excèdent 0,5% en 48 heures.
7. Ne pas entreposer ou répandre ce produit dans des aires accessibles à des animaux n'étant pas sous traitement ou à des animaux sauvages.

## ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit sec et frais en dessous de 30°C.  
Éviter le gel.