


POUDRE HYDROSOLUBLE DE TIAMULINE (Fumarate de tiamuline USP)

USAGE
VÉTÉRINAIRE
SEULEMENT
Emballages
152,5 g
DIN 02324407

Poudre soluble pour les porcs

INGRÉDIENT ACTIF: Chaque pot de 152,5 g contient: Tiamuline (sous forme de fumarate de tiamuline USP) 55,7 g



Indications:

Pour le traitement de la dysenterie porcine causée par *Serpulina hydysenteriae*.

Posologie Et Administration

Ajouter le contenu de ce pot à 1136 L (250 gallons impériales) d'eau d'abreuvement (ceci fournira 49 mg d'activité antibiotique par litre). Administrer à ce dosage comme seule eau d'abreuvement pendant 5 jours.

Pour les distributeurs automatiques qui distribuent 7,8 mL de solution mère par litre (1 oz. par gallon américain), préparer la solution mère en dissolvant le contenu de ce pot en 8,87 L d'eau.

Préparation des solutions médicamenteuse

Ajouter le contenu d'un pot de la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline dans récipient propre et net. N'utiliser pas un récipient galvanisé (ou autre métal) si corrodé car la corrosion peut diminuer l'efficacité de cette drogue.

Ajouter approximativement 4 L d'eau d'abreuvement.

Mélanger soigneusement jusqu'à toute la poudre est dissous.

Ajouter cette solution à la quantité exacte de l'eau d'abreuvement ou corriger le volume au volume exact de la solution mère pour le distributeur automatique.

Mode d'emploi

Préparer l'eau médicamenteuse à nouveau chaque jour.

Servir l'eau médicamenteuse avec la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline comme seule source d'eau d'abreuvement pendant la période de traitement.

Contre-Indication

Les porcs qui reçoivent la Poudre Hydrosoluble de Tiamuline ne doivent pas avoir accès à ni être traités avec les ionophores (ex. monensin, salinomycine, narasine).

Précaution

N'utiliser que dans l'eau médicamenteuse pour les porcs. Ce médicament ne doit pas être administré aux truies pendant 4 semaines après l'insémination.

Si aucun amélioration est observé après 5 jours, rétablir le diagnostic. La défaillance du traitement peut être due à la présence des organismes non-susceptibles à la tiamuline ou autre complication.

Mise En Garde

Les animaux traités avec ce médicament ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 3 jours après la dernière administration du médicament.

Contacte directe avec ce produit pendant la préparation des solutions peut irriter la peau et les membranes muqueuses. Éviter l'inhalation.

Garder hors de la portée des enfants.

Effets Indésirables

Un sur dosage à la tiamuline a quelques fois provoqué une salivation transitoire, des vomissements et un effet calmant apparent chez les porcs. Dans de rares occasions, des rougeurs de la peau, surtout au niveau des cuisses et du ventre, ont été observées durant la médication. Si des signes de toxicité ou de rougissements de la peau se produisent, arrêter immédiatement le traitement avec l'eau médicamenteuse et donner de l'eau d'abreuvement fraîche.

Note : Durant le traitement, les porcs doivent être logés dans les conditions d'espace et sanitaires adéquates.

Entreposage

Entreposer dans un endroit sec entre 15 et 30°C.

Solutions totales

