

UNIPRIM[®] POUDRE ORALE

AGENT ANTIBACTÉRIEN

P_r

Usage vétérinaire
seulement
Contenu net
262.5g/750g/20kg
No. D'enregistrement
02241375

Ingredients Actifs:

Chaque gramme contient 67mg de triméthoprime et 333 mg de sulfadiazine.

©MACLEOD PHARMACEUTICALS, INC.
2600 CANTON COURT, SUITE C, FORT COLLINS, CO, 80525



INDICATIONS

Chevaux - pour le traitement des infections énumérées ci-dessous causées par des organismes sensibles :

Chevaux

- gourme aiguë
- autres infections respiratoires
- infections de blessures et infections postopératoires.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

La posologie pour la poudre UNIPRIM[®] administrée par voie orale aux chevaux, poneys et poulains est de 3,75 g par 50 kg. Une pelle (37,5 g) est suffisant pour traiter un animal de 500 kg. Cette posologie fournit 30 mg d'ingrédients actifs par kg par jour.

Mélanger la poudre dans une petite quantité de nourriture appétissante. La poudre UNIPRIM[®] est elle-même appétissante mais si le cheval traité ne consomme pas la dose entièrement, il faudrait considérer l'administration parentérale ou par dose orale directe avec un autre produit.

Poursuivre le traitement quotidien de l'animal jusqu'à 2 ou 3 jours après la disparition des symptômes. La durée du traitement habituel ne dépasse pas 7 jours consécutifs.

On peut traiter les chevaux uniquement avec UNIPRIM[®] en poudre mais on peut aussi faire un traitement initial par injection de triméthoprime et sulfadiazine et administrer par la suite une dose quotidienne de poudre UNIPRIM[®].

CONTRE -INDICATIONS

Ne pas administrer la poudre UNIPRIM[®] aux chevaux souffrant de lésions prononcées du parenchyme hépatique ou de dyscrosie sanguine ni à ceux qui ont déjà manifesté une sensibilité aux sulfonamides.

PRÉCAUTIONS

Ne pas administrer la poudre UNIPRIM[®] aux juments enceintes puisque son effet sur le poulain en gestation, lorsque administré selon les recommandations, n'est pas connu.

AVERTISSEMENT

Il faut attendre au moins 7 jours après le dernier traitement avec ce médicament avant d'abattre un animal pour fin de consommation.

ENTREPOSAGE

Conserver entre 2° et 35° C.



Distribuer par: Bio Agri Mix LP
C.P 399, Mitchell, ON
NOK 1N0
www.bioagrimix.com