

UNIPRIM® Granulé Oral
Agent Antibactérien
Pour Usage Vétérinaire Seulement
DIN 02320835

DESCRIPTION

Les granules de UNIPRIM renferment une partie de la triméthoprime, un antibactérien synthétique, et cinq parties de la sulfadiazine, un sulfamide. Les deux composants de UNIPRIM exercent un blocage séquentiel au niveau du métabolisme bactérien et produisent un degré d'activité très supérieur à celui de chacun des deux médicaments pris séparément.

FORME POSOLOGIQUE

UNIPRIM Granulé Oral est un produit contenant 6,7% p/p de triméthoprime USP et 33,3% p/p de sulfadiazine USP dans une base inerte.

ACTION

UNIPRIM engendre un effet antibactérien efficace dans une grande variété d'infections attribuables à des organismes Gram positifs et Gram négatifs. Les bactéries pathogènes qui déterminent une infection chez le cheval et qui sont sensibles à UNIPRIM *in vitro* comprennent les organismes suivants:

Organismes très sensibles:

<i>Escherichia coli</i>	<i>Shigella equivulvis</i>
<i>Salmonella</i> spp.	<i>Pasteurella</i> spp.
<i>Haemophilus</i> spp.	

Organismes sensibles:

<i>Streptococcus</i> spp.	<i>Staphylococcus</i> spp. (y compris les organismes producteurs de la pénicilline)
<i>Klebsiella</i> spp.	<i>Proteus</i> spp.
<i>Corynebacterium</i> spp.	<i>Bordetella</i> spp.
<i>Actinobacillus</i> spp.	<i>Listeria monocytogenes</i>

Organismes résistants:

<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<i>Leptospira</i> spp.
---------------------------------	------------------------

* Ordinairement résistant

INDICATIONS

Les granules de UNIPRIM sont indiqués pour le traitement des infections suivantes lorsque causées par des organismes sensibles:

- Gourme aiguë
- Autres infections des voies respiratoires
- Lésions et infections postopératoires

POSOLOGIE

La posologie quotidienne habituelle des granules de UNIPRIM chez les chevaux, les poneys et les poulains est de 3,75 g par 50 kg de poids corporel. Le contenu d'un gobelet doseur (37,5 g) est suffisant pour traiter 500 kg de poids vif. La posologie recommandée équivaut à une dose de 30 mg d'ingrédients actifs par kg par jour. Les granules doivent être mélangés avec une petite quantité d'aliments agréables au goût mais si le cheval traité ne consomme pas le médicament entièrement, on doit employer une posologie parentérale ou orale individuelle avec un produit alternatif. Continuer l'administration quotidienne pendant deux ou trois jours après le disparition des symptômes. Toutefois il ne faut pas poursuivre la thérapie pendant plus que sept jours consécutifs.

CONTRE-INDICATIONS

Il ne faut pas administrer les granules de UNIPRIM aux chevaux atteints de lésions prononcées du parenchyme hépatique ou de dyscrasies sanguines ni à ceux qui ont déjà manifesté une hypersensibilité aux sulfamides.

RÉACTIONS DÉFAVORABLES

On n'a pas relevé de réactions défavorables d'importance.

PRÉCAUTIONS

Il serait indiqué de ne pas administrer les granules de UNIPRIM aux juments gravides, étant donné qu'on n'a pas encore déterminé les effets du produit, utilisé selon le mode d'emploi, sur le fœtus.

MISE EN GARDE

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 7 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

ENTREPOSAGE

Conserver entre 2° et 35° C.

PRÉSENTATION

Pot de 20 kg, 750 g et 262,5 g.

MACLEOD PHARMACEUTICALS, INC.

Fort Collins, Colorado, USA

Distribué par:
BIO AGRI MIX LP

Boîte postale 399, Mitchell, Ontario, Canada, N0K 1N0