

VIRGINIAMYCIN 44

PRÉMÉLANGE MÉDICAMENTEUX

Usage vétérinaire
seulement

Contenu net 25 kg

No. D'enregistrement
02215691

Ingrédient Actif: virginiamycine 44g/kg



Poulets
de grill
et porcs

Indications:

Pour accélérer le taux de croissance chez les procs et les poulets à griller.
Pour améliorer l'efficacité alimentaire chez les poulets à griller.
Pour aider au traitement et au contrôle de la dysenterie porcine.
Pour prévenir l'entérite nécrotique chez les poulets à griller due à *Clostridium perfringens* susceptible à la virginiamycine.

Mode d'emploi:

Le PRÉMÉLANGE VIRGINIAMYCIN 44, doit être soigneusement mélangé dans la nourriture, afin d'assurer une distribution uniforme. Il est recommandé de diluer la quantité requise du prémélange avec un autre ingrédient afin d'obtenir une quantité totale de 10 kg à incorporer à l'aliment complet lors du mélange final.

NIVEAU EXIGÉ D'ACTIVITÉ DE VIRGINIAMYCINE PAR 1000 KG D'ALIMENT COMPLET	QUANTITÉ EXIGÉE DU PRÉMÉLANGE VIRGINIAMYCIN 44 PAR 1000 KG D'ALIMENT COMPLET	NIVEAU APPROXIMATIF D'ACTIVITÉ DE VIRGINIAMYCINE PAR KG DE POIDS CORPOREL PAR ANIMAL PAR JOUR
PORCS		
Pour aider à traiter et contrôler la dysenterie porcine.		
110 grammes pour 2 semaines suivi par:	2,5 kg	5,00 mg
55 grammes pour 4 semaines	1,25 kg	2,50 mg
Si après avoir cessé le traitement à 55 grammes/1000 kg la dysenterie revient, répéter le traitement selon les directions ci-dessus		
Pour accélérer le taux de croissance*:		
11 grammes	0,25kg	0,50mg
* COMMENCEZ LE TRAITEMENT AU SEVRAGE ET CONTINUEZ-LE PENDANT LA PÉRIODE DE CROISSANCE ET DE FINITION JUSQU'AU POIDS DU MARCHÉ		
POULETS À GRILLER		
Pour accélérer le taux de croissance et améliorer l'efficacité alimentaire:		
11 grammes	0,25 kg	0,50 mg
Pour prévenir l'entérite nécrotique due à <i>Clostridium perfringens</i> susceptible à la virginiamycine:		
22 grammes	0,50 kg	1,00 mg
N'ADMINISTRER QU' AUX POULETS A GRILLER A PARTIR DE L'AGE D'UN JOUR JUSQU'AU POIDS DU MARCHÉ		

MISE EN GARDE

Ne pas donner aux oiseaux dont les oeufs servent à la consommation humaine.

PRÉCAUTION

1. Ne pas donner aux oiseaux de rem placement et de reproduction.
2. Peut être utilisé avec les agents agglutinants de granules Bentonite, Pel-Aid, Agri-Colloïd ou Lignosol.
3. Conserver dans un endroit sec et frais en dessous de 30°C. Éviter le gel.
4. Refermer le contenant après usage.