

ZOAMIX®

PRÉMÉLANGE MÉDICAMENTEUX ANTICOCIDIEN

Ingrédient Actif: zualène 250g/kg

Usage vétérinaire
seulement

Contenu net 25 kg

No. D'enregistrement
00656917

Huvepharma®, 33 James Boucher Blvd., Sofia 1407, Bulgaria



Indications:

Pour aider à prévenir la coccidiose caecale et intestinale chez les poulets de grill, les poulettes de refonte et les dindons en croissance.

À n'utiliser que sous forme d'aliment complet

Mode d'emploi :

On suggère de préparer un mélange de ZOAMIX® et d'un autre ingrédient nutritif avant de l'incorporer à la ration finale. Cette méthode assurera une distribution complète et efficace du médicament dans la moulée médicamenteuse.

Pour Les Poulets à Griller: Utiliser 500 grammes de ZOAMIX® par tonne métrique de produit afin d'obtenir une moulée médicamenteuse renfermant 0,0125% p/p de zualène. Mélanger à fond le ZOAMIX dans la moulée médicamenteuse finale. Distribuer cette ration de façon continue comme seul aliment de la mise au poulailler jusqu'à l'abattage.

Pour Les Poulettes de Refonte : Employée lorsque les poulettes sont exposées à la coccidiose, la moulée médicamenteuse au zualène leur permettra de s'immuniser et d'éviter les pertes dues à cette maladie lorsque les poulettes recevront une moulée non médicamenteuse avant la ponte. Utiliser 500 grammes de ZOAMIX® par tonne métrique de produit afin d'obtenir une moulée médicamenteuse 0,0125% p/p de zualène. Distribuer cette ration de façon continue comme seul aliment depuis l'âge d'un jour. Arrêter la distribution de moulée médicamenteuse au zualène lorsque les poulettes sont âgées de 14 semaines.

Dindes: Lorsque les dindonneaux sont élevés en réclusion et que la coccidiose présente ordinairement un problème, utiliser 750 grammes de ZOAMIX par tonne métrique de produit afin d'obtenir une moulée médicamenteuse renfermant 0,0187% p/p de zualène. On doit nourrir continuellement les volailles avec une moulée médicamenteuse au zualène jusqu'à l'âge de 8 semaines et, si les conditions locales l'exigent, on peut prolonger le traitement à 14 semaines.

Poulets
et dindes

MISE EN GARDE

1. Ne pas distribuer à des poules pondeuses pendant la ponte.
2. Ne pas distribuer à des dindes pondeuses pendant la ponte.
3. Ne pas distribuer cet aliment médicamenteux à des poulettes de refonte après l'âge de 14 semaines.

ENTREPOSAGE

Entreposer ce produit dans un endroit sec à la température de la pièce. Maintenir hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTION

1. Ne pas servir cet aliment médicamenteux pour traiter les épidémies de coccidiose.
2. En cas de décès inattendus, consulter un vétérinaire ou un pathologiste aviaire et suivre ses instructions.